

Betegájékoztató: Információk a felhasználó számára

Prospan narancs és mentol ízű szirup

Borostyánlevél száraz kivonata

Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Prospan narancs és mentol ízű szirup és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Prospan narancs és mentol ízű szirup szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Prospan narancs és mentol ízű szirupot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Prospan narancs és mentol ízű szirupot tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Prospan narancs és mentol ízű szirup és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Prospan narancs és mentol ízű szirup növényi eredetű gyógyszer, melyet köptetőként alkalmaznak hurutos köhögés esetén.

2. Tudnivalók a Prospan narancs és mentol ízű szirup szedése előtt

Ne szedje a Prospan narancs és mentol ízű szirupot:

- ha allergiás a hatóanyagra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Gyomorhurutban vagy gyomorfekélyben szenvedő betegeknél óvatossággal alkalmazandó.

Hosszan tartó panaszok, vagy légszomj, láz, valamint gennyes vagy véres köpet esetén haladéktalanul keresse fel orvosát.

6 éven aluli gyermekek esetén a készítmény alkalmazása nem javasolt.

Egyéb gyógyszerek és a Prospan szirup

Gyógyszerkölcsonhatásokra vonatkozó vizsgálatokat nem végeztek.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vénül nélküli kapható készítményeket is.

Terhesség és szoptatás

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény szedése terhesség és szoptatás ideje alatt nem javasolt, mivel terhes és szoptató anyák esetében nem áll rendelkezésre elegendő információ.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Prospan szirup nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

A Prospan narancs és mentol ízű szirup szorbitot tartalmaz

A készítmény adagonként 1,9 g szorbitot tartalmaz.

A szorbit fruktózforrás. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette, hogy Ön (vagy gyermeke) bizonyos cukrokra érzékeny, vagy az örökletes fruktózintoleranciának nevezett ritka genetikai betegséget állapították meg Önnél (vagy gyermekénél), amely során szervezete nem tudja lebontani a fruktózt, beszéljen kezelőorvosával, mielőtt Ön (vagy gyermeke) bevinné vagy Önnél (vagy gyermekénél) alkalmaznák ezt a gyógyszert.

Ez a készítmény 0,51 mg alkoholt (etanolt) tartalmaz milliliterenként (megfelel 0,05 térfogatszázaléknak). A készítmény maximális adagjában (5 ml) található alkoholmennyiség kevesebb mint 1 ml sörnek vagy 1 ml bornak felel meg.

A készítményben található kis mennyiségű alkohol semmilyen észlelhető hatást nem okoz.

3. Hogyan kell szedni a Prospan narancs és mentol ízű szirupot?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Amennyiben az orvos másként nem rendel, a készítmény szokásos adagja:

Életkor	Egyszeri adag	Teljes napi adag
Felnőttek és 12 év feletti serdülők	5 ml megfelel 35 mg borostyánlevél kivonatnak	15 ml (5 ml naponta 3-szor) megfelel 105 mg borostyánlevél kivonatnak
6 és betöltött 12 év közötti gyermekek	5 ml megfelel 35 mg borostyánlevél kivonatnak	10 ml (5 ml naponta 2-szer) megfelel 70 mg borostyánlevél kivonatnak

A felhasználás módja

Az adagot a mellékelt adagolókupakkal kell kimérni (5 ml-es jelölés).

Az üveg használat előtt mindig jól felrázandó!

A szirupot hígítatlanul, reggel (délben) és este kell bevenni.

A kezelés időtartama

A kezelés időtartama függ a tünetek típusától és súlyosságától. Általában a kezelést legalább 1 hétig kell folytatni. Amennyiben a tünetek egy hétnél hosszabb ideig fennállnak, kérjük, keresse fel kezelőorvosát.

Kérjük, beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, ha a Prospan narancs és mentol ízű szirup hatását túl erősnek vagy túl enyhének érzi.

Ha az előírtnál több Prospan narancs és mentol ízű szirupot vett be

A Prospan narancs és mentol ízű szirupból nem szabad naponta többet bevenni, mint az adagolási táblázatban szerepel, vagy ahogy orvosa rendelkezik. Jelentősen nagyobb mennyiség bevétele (több mint a napi adag háromszorosa) émelygést, hányást és hasmenést okozhat. Ez esetben beszéljen kezelőorvosával.

Ha elfelejtette bevenni a Prospan narancs és mentol ízű szirupot

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására. Folytassa a Prospan narancs és mentol ízű szirup szedését a betegtájékoztatóban leírtaknak vagy kezelőorvosa utasításainak megfelelően.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A mellékhatások értékelése az alábbi gyakorisági kategóriákon alapszik:

Nagyon gyakori:	10 betegből több mint 1 beteget érinthet
Gyakori:	10 betegből legfeljebb 1 beteget érinthet
Nem gyakori:	100 betegből legfeljebb 1 beteget érinthet
Ritka:	1000 betegből legfeljebb 1 beteget érinthet
Nagyon ritka:	10000 betegből legfeljebb 1 beteget érinthet
Nem ismert:	a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg

Lehetséges mellékhatások:

Allergiás reakciók, mint légszomj, duzzanat, bőrpír és viszketés jelentkezhetnek borostyánt tartalmazó készítmények alkalmazását követően. A gyakoriság nem ismert.

Érzékeny betegeknél gyomor- bélrendszeri panaszok, mint émelygés, hányás és hasmenés jelentkezhetnek. A gyakoriság nem ismert.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a Prospan narancs és mentol ízű szirupot tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon és az üvegen feltüntetett lejárati idő {Felhasználható: Felh.:} után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik. Felbontás után 6 hónapig felhasználható.

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Prospan narancs és mentol ízű szirup?

- A készítmény hatóanyaga: borostyánlevél száraz kivonata
5 ml készítmény 35 mg borostyánlevél száraz kivonatot (5–7,5:1) tartalmaz. Kivonószer: 30% m/m etanol.

- Egyéb összetevők: kálium-szorbát (tartósítószer), vízmentes citromsav, xantán gumi, kristályosodó szorbit szirup 70%, természetes narancs aroma (etanolt tartalmaz), természetes menta aroma, levomentol, tisztított víz.
5 ml szirup 1,9 g szorbitot (édesítőszer) tartalmaz, ami 0,16 kenyéregységnek felel meg.

Milyen a Prospan narancs és mentol ízű szirup készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Fehér polietilén csavaros biztonsági kupakkal lezárt barna üveg a kiöntőre szerelt átlátszó LDPE szűkítővel, valamint 2,5, 5, 7,5 és 10 ml beosztású átlátszó polipropilén adagolókupakkal, dobozban.
Kiszerezés: 100 ml és 200 ml.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.
Herzbergstr. 3., D-61138 Niederdorfelden
Németország

Magyarországi képviselő:

Alpen Pharma Kft,
1095 Budapest, Soroksári út 48.

OGYI-T-21292/04 1 × 100 ml

OGYI-T-21292/05 1 × 200 ml

Mindegyik csomagolása: barna üvegben a kiöntőre szerelt átlátszó LDPE szűkítővel + átlátszó polipropilén adagolókupakkal

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2022. október

Megjegyzés:

A Prospan narancs és mentol ízű szirup növényi eredetű hatóanyagot tartalmaz, ezért esetenként a szirup zavarosnak tűnhet vagy az íze eltérhet a megszokottól. Ez azonban a készítmény minőségét nem befolyásolja.